BioResource Now!

Issue Number 11 November 2015

国内外のバイオリソースを巡る様々な問題や取り組みについて、毎月ホットな話題をこのニュースレターで紹介していきます。

研究とバイオリソース
No.22

小松田 隆夫 (国立研究開発法人 農業生物資源研究所)

オオムギ種子分散システムの進化と栽培化起源地

じょうほう通信:
No.99

新たなブラウザ "Microsoft Edge"

P1 - 2

P2

NewsLetter に掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。すべての内容は日本の著作権法、及び国際条約により保護されています。

ニュースレターのダウンロード先

URL: www.shigen.nig.ac.jp/shigen/news/

研究とバイオリソース (NO.22)

オオムギ種子分散システムの進化と栽培化起源地

小松田 隆夫

農業生物資源研究所 農業生物先端ゲノム研究センター
作物ゲノム研究ユニット 上級研究員

はじめに

野生オオムギの実が成熟して散らばることは、自生地を拡大するうえで大事な性質です。しかし、ヒトの観点からすると実が成熟して収穫する際に落ちてしまうと収量は少なくなります。人類は収集した野生オオムギの中に実の落ちない突然変異が起きた植物があるのを見つけて、これを植えると一回の作業で実をたくさん収穫できることを発見しました。このようなオオムギを発見して栽培したことが“人類最古の農業”の始まりだと考えられています。いったいオオムギはどこでいつ頃栽培化されたのでしょうか。

イスラエルやシリア、トルコ、イラク、イランなどいわゆる「肥沃な三日月地帯」の有史以前の遺跡には、土器や泥の中にオオムギの炭化種子が見つかっています。野生オオムギを集めて食用とすることは2万3千年以上前に行われていたことが遺跡の調査から分かっていました。野生オオムギからの栽培型オオムギの出現は炭素年代測定により1万年前ころと推定されています。しかしオオムギがどこで栽培化が開始されたのか明確な答えはありませんでした。そもそも栽培化は一回だけだったのでしょうか、それとも複数回あったのでしょうか。

これまで、岡山大学では野生オオムギの穀粒が落ちることに必須な2つの遺伝子 (*Btr1* と *Btr2*) の存在を60年以上前から研究しています。この2つの遺伝子は密接に連鎖しています。

図1. 野生オオムギの種子脱落の様子 (文献1)

穀粒実が落ちることに関わる遺伝子 *Btr1* と *Btr2* の生物学的機能

野生オオムギでは実が成熟すると穂の軸の節々の連結がはずれてバラバラになります (図1)。これまで本現象は、木々の葉や果実が成熟して自然に落ちる際に作られる「離層」と同じ仕組みによると長く信じられていました。離層では成熟とともに細胞間の接着物質が徐々に分解されることによって細胞と細胞が自然に乖離し、木々の葉や果実が、そしてイネや麦類の一部では穀粒が母体から脱落します。しかし今回、実際はオオムギではこのような離層が作られず、その代わりに穂の軸の節々で細胞壁の二次層、三次層が形成されないため細胞壁が極端に薄くもろくなることを発見しました。薄い細胞壁が乾燥によって物性の変化を生じ、さらに風や重力、動物が触れることなどによって細胞壁がぐちゃぐちゃになり、穀粒が落ちることが分かりました。したがって、2つの遺伝子は穂の軸の節で働いて、細胞壁を薄くもろくする役割があるといえます (図2)。

遺伝子 *Btr1* と *Btr2* の進化

本研究グループはゲノム情報、遺伝学的解析および分子生物学的な証明を組み合わせて、2つの遺伝子を単離してDNA配列を決定しました。

それは196アミノ酸および202アミノ酸からなる蛋白質をコードする、いずれも全く新規な遺伝子でした。2つの遺伝子の進化を探るため、オオムギが持つ本遺伝子と、オオムギやコムギ、イネなどイネ科植物が持つ類似の遺伝子を比較。オオムギでは本遺伝子がセットで2倍 (合計4つ) になっており、さらにそのうち1セットでは塩基配列がわずかに変化し、二つの膜貫通ドメインなど新たな機能を持つ蛋白質を作ることを見ました。コムギも同じ機能の遺伝子を持つことから、本遺伝子の重複と機能進化はムギ類に特有で、ムギ類が *Brachypodium* と分岐して以降に起きたことが分かりました。

栽培オオムギの起源

岡山大学では60年以上前に、野生オオムギの実が落ちることに関わる2つの遺伝子 *Btr1* と *Btr2* の存在を研究し、それらが野生オオムギの自生地の西と東で集められた栽培オオムギ品種で異なっていることを発見しました。つまり世界中のオオムギ品種は大きく2つのグループに分類されることを明らかにしました。しかし、現在私たちが利用しているオオムギがどこで、どのようにして生まれたかは分かっていませんでした。

図2. 細胞壁が脆弱化する事による小穂脱落。A, C, E, Gは野生オオムギの成熟穂、穂軸節の縦断面、同透過型電子顕微鏡図、同透過型電子顕微鏡図による観察像。B, D, F, Hは野生オオムギから誘導した変異体の対応する器官組織の観察像。(文献1)

今回、本研究グループは 529 系統の野生オオムギと 274 品種の栽培オオムギについて、2 つの遺伝子の DNA 配列の変化を比較。その結果、栽培オオムギが祖先となった野生オオムギから、二回栽培化されたことを明らかにしました。最初は南レバント (イスラエル) で *Btr1* が *btr1* へ突然変異し (図 3A)、その後、北レバント (北西シリアから南東トルコ) で *Btr2* が *btr2* へ別の突然変異が起こったことを突き止めました (図 3B)。現在、栽培オオムギの品種は大きく 2 つのグループに分類されており、両突然変異の子孫を利用して、“人類最古の農業”が始まったことが明らかになりました。

Haberer and Mayer (2015) による Feature article もわかり易いので時間のない方にお勧めします (図 4)。

図 3. 栽培オオムギの起源地の推定。(A) 野生オオムギが南レバントで *btr1* 突然変異し現在の欧州等 (西) の栽培オオムギ (赤色) が起源した。(B) 野生オオムギが北レバントで *btr2* 突然変異し現在の日本等 (東) の栽培オオムギ (緑色) が起源した。(文献 1) を改変

図 4. オオムギは世界で 4 番目の重要作物 (A) 国別オオムギ生産量 (2013 単位百万トン FAOSTAT) (文献 1)。オオムギは南レバントで小穂非脱落性遺伝子 *btr1* により栽培化された事を明らかにした。(B) Pooideae (オオムギを含む) は *Btr1* の重複と機能分化によって麦類に固有な種子脱落機構を獲得した。Ehrhartoideae (イネを含む) ではこのような進化が生じなかった (この模式図には描かれているが)。*Btr2* も同様の遺伝子進化を遂げた。(C) *Btr1* はレセプターを *Btr2* はリガンドをコードするという仮説が提案された (文献 2)。

文献 1 Pourkheirandish et al. (2015) Evolution of the grain dispersal system in barley. *Cell* 162, 527-539.
 文献 2 Haberer and Mayer (2015) Barley: From Brittle to Stable Harvest *Cell* 162, 469-471

新たなブラウザ “Microsoft Edge”

ブラウザのシェア

あなたは普段、どの Web ブラウザを利用しているでしょうか。日本で最も使われているブラウザは、Windows パソコンに標準搭載されている Microsoft 社提供の Internet Explorer (IE) ですが、他のほとんどの国では Google 社提供の Chrome がトップシェアを占めています。日本でも Chrome のシェア率は年々上昇しており、IE の人気は下降しています (図 1)。

図 1. NET MARKET SHARE: 世界における web ブラウザシェア (Oct. 2013 - Oct. 2015)※1

図 2. Web ノートの例

Microsoft 社から新ブラウザの登場

インターネットの閲覧方法はタブレット端末等のスマートデバイスの登場により、急速に多様化しました。Web 技術は日々進化し、各ブラウザもその進化に順次対応しています。現在 Microsoft 社で最も古いブラウザは 2006 年に公開された IE7 であり、2016 年 1 月までサポートされています※2。最新の IE は Windows7 から利用できる IE11 で、IE7 から 11 まで計 5 つのバージョンが存在しています。この古いブラウザを刷新するために、同社は新たなブラウザ “Edge” を発表しました。Edge は Windows10 から搭載され、IE とは異なるブラウザであり今後の Windows 標準ブラウザになります。

※1 <http://netmarketshare.com/>
 ※2 <https://www.microsoft.com/ja-jp/windows/lifecycle/iesupport/>

じょうほう通信 [第 99 回]

“Edge” のユニークな機能

一般的にインターネットを閲覧する場合には、デザインの変化のみで IE と Edge は大きく変わらないように見えますが、新たな機能が搭載されています。その中で特に Web ノート機能についてご紹介いたします。この機能は、表示している Web ページに対して、ノートへ書き込むように自分のコメントを記載することができます。上部メニューの「Web ノート」ボタンで記載可能になります。コメント付きの Web ページは「お気に入り」へ保存することができます。これまでの場合には、スクリーンショットを撮りペイント等でコメントを加える必要がありましたが、「Web ノート」の場合 Edge 以外のアプリケーションを起動しませんが、この機能の活用方法として、オンライン記事へマーカーを付けて共有することや、HP 操作の解説ページ作成 (図 2) が挙げられます。活用してみたいはいかがでしょうか。

他にも Edge の新機能として、広告やメニューバー等で、情報が多いページから内容だけを取り出したシンプルページへ変換させる「読み取りモード」や、「Cortana へ質問」機能があります (図 3)。Cortana とは Microsoft 社のユーザーアシスト機能のことで、その機能へ質問することで今表示している Web ページから移動せずに情報を得ることができます。質問結果は Web 検索の他、特定の情報 (天気・ニュース・株価 等) の場合はまとめた情報を表示します (図 4)。Cortana は人工学習機能のため今後の展開が楽しみです。

図 3. 「Cortana へ質問」例: バイオリソース勢ぞろい

図 4. 「Cortana へ質問」例: 三島

このように、他のブラウザには無い機能を標準搭載した “Edge”。新たなブラウザ選択肢により、ブラウザの世界シェアの変動が注目されます。

(長洞 美鹿)

Contact Address

連絡先 〒411-8540 静岡県三島市谷田 1111
 国立遺伝学研究所 生物遺伝資源センター
 TEL 055-981-6885 (山崎)
 E-mail: brnews@shigen.info

バイオリソース情報

(NBRP) www.nbrp.jp/
 (SHIGEN) www.shigen.nig.ac.jp/indexja.htm
 (WGR) www.shigen.nig.ac.jp/wgr/
 (JGR) www.shigen.nig.ac.jp/wgr/jgr/jgrUrlList.jsp

Editor's Note

60 年以上も前に存在が明らかになっていた遺伝子が今日のゲノム解析によってその構造が解明され、脱粒の新しいメカニズムの解明に至った。そしてリソースセンターが保存する多くの野生系統と品種の塩基配列を比較することによって、最も古い農業の起源が明らかになったという、スケールの大きいドラマチックな研究成果をご紹介いただきました。いかがでしたか。1 万年前の肥沃な良い土地を想像し、現代人にとっても平和で住みよい土地になって欲しいと強く思いました。(Y.Y.)